



## CANNABIS SATIVA

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Sativex® se utiliza habitualmente para mejorar la espasticidad moderada o grave en pacientes con esclerosis múltiple.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY VIAL 10ML E/3

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2 y 8 °C). Guardar en posición vertical. Una vez abierto el envase pulverizador, no es necesaria su conservación en nevera, pero debe conservarse a una temperatura inferior a 25 °C.

### ¿Cómo se administra?

Sativex® es una solución que debe pulverizarse en la superficie bucal alternando el lugar de aplicación en cada administración.

La cantidad y momento de las pulverizaciones variará según el paciente. El número de pulverizaciones debe aumentarse gradualmente según la tabla siguiente, hasta conseguir la respuesta deseada (máximo 12 pulverizaciones al día). La dosis de la tarde/noche debe administrarse en cualquier momento entre las 16 horas y la hora de acostarse. Cuando se administre la dosis de la mañana debe hacerse en cualquier momento entre la hora de levantarse y el medio día. Debe dejar transcurrir 15 minutos entre cada pulverización.

Día	Pulverizaciones mañana	Pulverizaciones noche	Día	Pulverizaciones mañana	Pulverizaciones noche
1	0	1	8	2	4
2	0	1	9	2	5
3	0	2	10	3	5
4	0	2	11	3	6
5	1	2	12	4	6
6	1	3	13	4	7
7	1	4	14	5	7

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvido, adminístrese la dosis tan pronto como sea posible, excepto si está próxima la siguiente dosis.

Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son mareos, somnolencia y fatiga. Sobre todo se experimentan durante las primeras semanas o periodos de ajuste de dosis, pero remiten en unos días si sigue correctamente la pauta de incremento de dosis. También se puede experimentar ansiedad, cambios de humor o de estado de ánimo y alucinaciones. Es importante vigilar estos síntomas y comunicárselo a su médico o farmacéutico.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Sativex®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el mismo informe inmediatamente a su médico. Sativex® se excreta por leche materna, por lo que no debe utilizarse durante el periodo de lactancia.

Sativex® contiene una pequeña cantidad de etanol muy inferior a un pequeño vaso de vino diario.

### Excipientes de declaración obligatoria

Etanol  
Propilenglicol

### Identificación

Cada estuche contiene 3 envases pulverizadores de vidrio topacio.



### ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO