



UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76
Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es
http://ufpelafe.wix.com/ufpelafe

DARUNAVIR/COBICISTAT (REZOLSTA®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Darunavir es un inhibidor de la proteasa, que combinado con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por VIH. Cobicistat se utiliza como potenciador del efecto de Darunavir.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

REZOLSTA 800 mg / 150 mg COMP E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C)

¿Cómo se administra?

La pauta habitual es de 1 comprimido al día que se debe tragar entero, con un vaso de agua y CON alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Darunavir/Cobicistat se han descrito: trastornos gastrointestinales (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal), cansancio, cefalea (dolor de cabeza), rash (erupción cutánea), hipercolesterolemia e hipertriglicemia (aumento del colesterol y triglicéridos en sangre), hiperglucemia (aumento del azúcar en sangre), hiperbilirrubinemia con ictericia (aumento del nivel de bilirrubina en la sangre con coloración amarillenta de piel y mucosas) y posible sangrado en pacientes hemofílicos.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin avisar a su médico.

Darunavir/ Cobicistat puede interferir con el efecto de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

El tratamiento antirretroviral no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus a otras personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz durante el tratamiento, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

REZOLSTA 800 mg/150 mg: comprimidos recubiertos ovalados de color rosa marcados con "800" en una cara y "TG" en la otra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**