



FELBAMATO

¿Qué es y para qué se utiliza?

Felbamato está indicado como tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut en pacientes resistentes a otros tratamientos para la epilepsia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TALOXIA COMP 400MG E/100

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 25°C)

¿Cómo se administra?

Felbamato se administra por vía oral. Su médico le indicará la dosis exacta de felbamato que le corresponde y podrá ir variándola en función de los síntomas.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con felbamato pueden aparecer reacciones adversas entre las que se incluye:

- Aumento de la incidencia de eventos adversos hematológicos como la anemia.
- Reacciones de hipersensibilidad aguda.
- Alteraciones hepáticas.

También se ha observado, cuando se usa en combinación con otras terapias:

- Náuseas, anorexia, mareos y vómitos, pérdida de peso, insomnio, visión doble.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de felbamato. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el mismo, informe inmediatamente a su médico. Felbamato se excreta por leche materna, estando contraindicado su uso durante la lactancia.

Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol

Identificación

Taloxa® se presenta en blísters de aluminio conteniendo 100 comprimidos blancos y ranurados.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO