



DARUNAVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Darunavir es un inhibidor de la proteasa que, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

PREZISTA COMP 300MG E/120

PREZISTA COMP 400MG E/60

PREZISTA COMP 600MG E/60

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tragar los comprimidos enteros con un vaso de agua y CON alimentos (estómago lleno).

Darunavir se toma habitualmente con ritonavir, en ese caso, ambos fármacos deben administrarse juntos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis que la olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a darunavir se han descrito: cefalea, trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos), cansancio, erupción en la piel, aumento del colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, posible aumento de sangrado en pacientes hemofílicos.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de darunavir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo NO HORMONAL eficaz durante el tratamiento, ya que la efectividad de los anticonceptivos hormonales puede verse reducida. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Amarillo ocaso FCF (E110)

Polivinilalcohol

Identificación

PREZISTA® 300MG: comprimidos ovalados de color naranja marcados con "300MG" en una cara y "TMC114" en la otra.

PREZISTA® 400MG: comprimidos ovalados de color naranja claro marcados con "400MG" en una cara y "TMC" en la otra.

PREZISTA® 600MG: comprimidos ovalados de color naranja marcados con "600MG" en una cara y "TMC" en la otra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conservar sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO