



APREMILAST



¿Qué es y para qué se utiliza?

Apremilast es un agente inmunosupresor selectivo que actúa reduciendo la inflamación asociada a ciertas enfermedades autoinmunes como la artritis psoriásica o la psoriasis.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

OTEZLA 10/20/30 MG COMP E/27

OTEZLA 30 MG COMP E/56

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos de OTEZLA® enteros, con un vaso de agua, CON o SIN alimentos. No se debe masticar, machacar ni partir el comprimido. Tome OTEZLA® aproximadamente a la misma hora cada día, un comprimido por la mañana y un comprimido por la noche.

Cuando empiece a tomar OTEZLA® por primera vez, para los primeros 14 días recibirá un “pack de inicio de tratamiento” que está etiquetado para facilitar que tome la dosis correcta a la hora correcta. Su tratamiento comenzará a una dosis más baja e irá aumentando paulatinamente durante los primeros 6 días de tratamiento de la siguiente manera:

Día 1: mañana 10 mg (rosa); noche descanso

Día 2: mañana 10 mg (rosa); noche 10 mg (rosa)

Día 3: mañana 10 mg (rosa); noche 20 mg (marrón)

Día 4: mañana 20 mg (marrón); noche 20 mg (marrón)

Día 5: mañana 20 mg (marrón); noche 30 mg (beige)

Día 6: mañana 30 mg (beige); noche 30 mg (beige)

Día 6 en adelante: mañana 30 mg (beige); noche 30 mg (beige)

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten menos de 6 horas para la próxima. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a OTEZLA® destacan: diarrea, náuseas, tos, dolor de espalda, vómitos, cansancio, dolor de estómago, insomnio y mayor riesgo de infecciones.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto del OTEZLA® cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, OTEZLA® también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

OTEZLA® 10 mg: comprimido recubierto, con forma de rombo, de color rosa, con “APR” grabado en una cara y “10” en la otra.

OTEZLA® 20 mg: comprimido recubierto, con forma de rombo, de color marrón, con “APR” grabado en una cara y “20” en la otra.

OTEZLA® 30 mg: comprimido recubierto, con forma de rombo, de color beige, con “APR” grabado en una cara y “30” en la otra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	
																

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**