



RIBAVIRINA (Rebetol®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Agente antiviral indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con peginterferon alfa o interferon alfa.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

REBETOL Caps 200mg E/168

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

¿Cómo se administra?

Los comprimidos se administran por vía oral, en dos tomas (mañana y noche) y coincidiendo con la ingesta de alimentos. Los comprimidos no se deben romper ni triturar.

Debe tener precaución cuando se manipulen comprimidos rotos. Si accidentalmente toca comprimidos dañados, lave a fondo con agua y jabón la zona del cuerpo en contacto.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: náuseas, vómitos, diarrea, molestias gástricas, pérdida de peso y apetito, prurito, insomnio, irritabilidad, depresión, cansancio y debilidad (como consecuencia de la anemia), elevación de la bilirrubina y del ácido úrico.

Consulte con su médico o farmacéutico si aprecia estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ribavirina. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

La ribavirina puede causar daños al feto. No debe tomar ribavirina si está embarazada, no deberá iniciar tratamiento hasta que se haya obtenido un resultado negativo en un test de embarazo realizado inmediatamente antes del comienzo del tratamiento. Se recomiendan medidas anticonceptivas eficaces tanto en los pacientes varones como en las mujeres durante el tratamiento con ribavirina y hasta seis meses después de interrumpirlo.

Suspenda la lactancia antes de empezar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

REBETOL® 200 mg: lactosa, propilenglicol y sales.

Identificación

REBETOL® 200 mg: cápsulas de gelatina duras, blancas y con la inscripción "200 mg" impreso en tinta azul. Envase de 168 cápsulas.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**