



## CINACALCET



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Cinacalcet es un fármaco usado para tratar el hiperparatiroidismo secundario en pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. Cinacalcet también se utiliza en el tratamiento de hiperparatiroidismo primario y en la disminución de los niveles elevados de calcio en sangre.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

MIMPARA 30 MG COMP E/28

MIMPARA 60 MG COMP E/28

MIMPARA 90 MG COMP E/28

### ¿Cómo se debe conservar?

Cinacalcet no requiere condiciones especiales de conservación.

### ¿Cómo se administra?

Debe tomarlo CON alimentos. Los comprimidos deben tragarse enteros (no masticar o romper los comprimidos) y con un vaso de agua u otra bebida.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Cinacalcet puede producir náuseas y vómitos y disminuir los niveles de testosterona en sangre.

Cinacalcet disminuye los niveles séricos de calcio que pueden manifestarse con hormigueo, dolores musculares, calambres, rigidez y convulsiones. Si sufre cualquiera de estos síntomas consulte inmediatamente con su médico.

Se han descrito casos aislados de hipotensión y/o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con la función cardíaca deteriorada que tomaban cinacalcet.

### Observaciones

El tratamiento con cinacalcet puede ir acompañando de medicamentos para controlar los niveles del fósforo y/o análogos de vitamina D. Siga las instrucciones de su médico en cuanto a la toma de estos fármacos.

Muchos medicamentos de uso habitual pueden interactuar o interferir con el efecto de cinacalcet. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Cinacalcet debe administrarse durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. Se desconoce si se excreta en la leche materna. Después de una valoración detenida de la relación beneficio/riesgo, habrá que decidir si suspender la lactancia o interrumpir el tratamiento con cinacalcet.

### Excipientes de declaración obligatoria

Almidón de maíz

Lactosa

### Identificación

Cinacalcet se presenta como comprimido recubierto con película, de color verde claro y ovalado, marcado con "AMG" en una cara y "30", "60" o "90" en la otra.



### ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**