



UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76
Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es
http://ufpelafe.wix.com/ufpelafe

SIMEPREVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Simeprevir es un agente antiviral indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con otros fármacos. No debe ser administrado como monoterapia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

OLYSIO 150 MG CAPS E/28

¿Cómo se debe conservar?

No requiere ninguna temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Simeprevir debe tomarse por vía oral una vez al día CON alimentos. El tipo de alimento no afecta la exposición al fármaco. La cápsula debe tragarse entera.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvido, si omite una dosis de simeprevir y lo advierte en las 12 horas siguientes a la hora habitual de la toma, debe tomar la dosis omitida con alimentos lo antes posible y tomar la dosis siguiente a la hora habitual prevista.

Si omite una dosis de simeprevir más de 12 horas después de la hora habitual de la toma no debe tomar la dosis omitida y debe reanudar la toma con alimentos a la hora habitual prevista. No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a simeprevir se encuentran: náuseas, erupción cutánea, picor, disnea (sensación de falta de aire), hiperbilirrubinemia (aumento de la bilirrubina en sangre) y fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de simeprevir cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

El tratamiento combinado de simeprevir, peginterferón y rivabirina puede influir en la capacidad de conducción ya que se ha asociado con la aparición de fatiga, mareos y visión borrosa.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si una paciente quedara embarazada durante el mismo, debe informar inmediatamente a su médico. Se desconoce si simeprevir se excreta por leche materna. Se recomienda interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento con simeprevir.

Se han observado reacciones de fotosensibilidad por lo que es de importancia aplicar medidas de protección solar apropiadas durante el tratamiento con simeprevir. Debe evitar la exposición excesiva al sol y el uso de aparatos de bronceado.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Olysis® se presenta en una caja conteniendo 28 cápsulas duras repartidas en blísters perforables con 7 cápsulas cada uno. Cada cápsula tiene una cubierta blanca con el logotipo "TMC435 150" impreso en tinta negra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19		20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**