



## MILTEFOSINA



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Este medicamento está indicado para el tratamiento de Lesihmaniosis cutánea y visceral.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

IMPAVIDO CAPS 50 MG E/84

### ¿Cómo se debe conservar?

No conservar a temperatura superior a 30 °C.  
Mantener el frasco perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Impavido se debe tomar con las comidas. La dosis es de 2-8 cápsulas diarias, que deben dividirse en 2-3 tomas, en la mañana y la noche.  
La duración del tratamiento es de 28 días.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar el medicamento, tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son vómitos, náuseas, diarrea y aumento de las enzimas hepáticas.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de pitolisant. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Cápsulas cerradas herméticamente presentadas en blíster de aluminio.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**