



ENFUVIRTIDA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Enfuvirtida es un inhibidor de la fusión que, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

FUZEON VIAL 90MG E/60

¿Cómo se debe conservar?

Mantener a temperatura ambiente antes de su reconstitución. Una vez reconstituido el vial conservar en nevera un máximo de 24 horas, siempre que esté limpio y transparente, y protegido de la luz.

¿Cómo se administra?

Se administra vía subcutánea (VER DOCUMENTO NORMAS ADMINISTRACIÓN). Administre cada nueva inyección en un sitio diferente a la anterior. Los lugares de inyección son el abdomen, la parte superior de los brazos y la cara externa de los muslos. Evite la línea del cinturón y un área de 2 a 3 cm alrededor del ombligo. Evite siempre los lugares de inyección donde previamente haya experimentado dolor, molestias, o reacciones claras.

Siga siempre las instrucciones para la correcta administración de FUZEON®.

Las jeringuillas utilizadas deben ser siempre eliminadas en el envase para eliminar objetos cortantes y punzantes.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a enfuvirtida se encuentran: reacciones en el lugar de la inyección que normalmente mejoran a la semana (picor, engrosamiento de la piel, hinchazón, enrojecimiento, dolor y aparición de bultos bajo de la piel), dolor de cabeza y fiebre.

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de enfuvirtida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Evite la lactancia materna durante el tratamiento.

Enfuvirtida puede provocar mareos por lo que se recomienda especial precaución al conducir o utilizar máquinas peligrosas.

Excipientes de declaración obligatoria

Manitol

Identificación

FUZEON® VIAL 90MG: polvo y disolvente para solución inyectable, el polvo es de color blanco a blanquecino.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO