



DACLATASVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Daclatasvir es un agente antiviral indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con otros antivirales. No debe ser administrado como monoterapia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

DAKLINZA 60 MG COMP E/ 28

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C) y en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Daclatasvir debe tomarse por vía oral con o sin alimentos una vez al día. Debe tragárselos enteros, no mastique ni machaque los comprimidos ya que tienen un sabor desagradable.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general, daclatasvir es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento combinado son cefalea (dolor de cabeza), náuseas y astenia (cansancio y fatiga).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de daclatasvir cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, daclatasvir también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y hasta 5 semanas después de su finalización. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si daclatasvir puede excretarse por leche materna por lo que no se recomienda lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Daklinza® 60 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película. Cada envase contiene 28 comprimidos.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO