



EVEROLIMUS (Votubia®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Everolimus (Votubia®) es un medicamento indicado para el tratamiento de angiomiolipoma renal (una enfermedad del riñón) y astrocitomas (un tipo de tumor cerebral).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

VOTUBIA 2,5 MG 40 COMPRIMIDOS

VOTUBIA 5 MG 30 COMPRIMIDOS

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C).

¿Cómo se administra?

Everolimus se puede tomar con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo (con el mismo tipo de comida) y a la misma hora del día.

Los comprimidos deben de tragarse enteros con un vaso de agua. Si no puede tragar los comprimidos, estos pueden disolverse completamente en un vaso con aproximadamente 30 ml de agua removiendo suavemente, inmediatamente antes de beberlo.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que olvide una dosis, NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son alteraciones gastrointestinales (diarrea, náuseas, dolor abdominal), úlceras en la boca, riesgo aumentado de infecciones (incluida neumonía), anemia, hipertensión, acné, aumento de colesterol y triglicéridos en sangre.

Avisé a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de everolimus cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomado actualmente cualquier otro medicamento, incluido aquellos adquiridos sin receta.

Durante el tratamiento con Everolimus deberá evitarse el uso de vacunas vivas. Consulte con su médico antes de vacunarse.

Everolimus no debe utilizarse durante el embarazo; si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. La lactancia materna debe evitarse durante el tratamiento con everolimus.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**