



## LISDEXANFETAMINA



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Lisdexanfenamina se utiliza para el trastorno por déficit de atención-hiperactividad (TDAH).

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ELVANSE cáps 30mg E/28

ELVANSE cáps 50mg E/28

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente, no superior a 25°C.

### ¿Cómo se administra?

Lisdexanfetamina puede tomarse con o sin alimentos.

Puede tragarse entero o bien puede abrirse la cápsula y disolver todo el contenido en un vaso de agua. Si en el contenido ha quedado algo de polvo compacto puede usarse una cucharilla para deshacer el polvo en el agua. Debe agitarse el contenido hasta que se disperse totalmente.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de haber olvidado una toma, puede continuar con la dosis de lisdexanfetamina al día siguiente. Las dosis por la tarde deben evitarse por el potencial de provocar insomnio.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: disminución del apetito, insomnio, boca seca, dolor de cabeza, disminución de peso y dolor en la parte superior abdominal.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de lisdexanfetamina cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, lisdexanfetamina también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Dietas ricas en frutas y verduras o patologías tipo infecciones urinarias pueden favorecer la eliminación del fármaco en orina, disminuyendo su efectividad. Mientras que por lo contrario, dietas ricas en proteínas animales, el uso de algunos diuréticos o patologías tipo diabetes pueden aumentar su efectividad. Por todo ello, se recomienda una dieta variada y equilibrada.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Lisdexanfetamina solo debe utilizarse durante el embarazo si el beneficio justifica el riesgo potencial para el feto. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

ELVANSE® se presenta en forma de cápsulas duras con cuerpo blanco opaco y tapa rosa opaca, impresión "S489" y "30 mg" en tinta negra.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20			22	23	
																		

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**