



FINGOLIMOD

¿Qué es y para qué se utiliza?

Fingolimod está indicado en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Produce una disminución de las exacerbaciones y un retraso en la aparición de los síntomas.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

GILENYA CÁPS 0,5MG E/28

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (15-30°C)

¿Cómo se administra?

Fingolimod se administra por vía oral. La dosis habitual es de una cápsula al día ingerida con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con fingolimod pueden aparecer reacciones adversas entre las que se incluyen:

- Frecuentes: dolor de cabeza y espalda, resfriados, diarrea, elevación de enzimas hepáticas y tos.
- Otras: alteraciones cardíacas (arritmias, bloqueos), infecciones, edema macular, alteraciones hepáticas y respiratorias.

En el caso de aparición de éstos o cualquier otro tipo de efectos consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de fingolimod. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Durante el tratamiento con fingolimod y dos meses tras su finalización, debe evitarse el uso de vacunas atenuadas debido al riesgo de infección.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si una paciente quedara embarazada durante el mismo, debe informar inmediatamente a su médico. Se desconoce si fingolimod puede excretarse por leche materna. Antes de iniciar la lactancia materna, consulte con su médico.

Excipientes de declaración obligatoria

No contiene

Identificación

Gilenya® se presenta en envases conteniendo 28 cápsulas duras. Las cápsulas están compuestas de un cuerpo blanco con dos rallas amarillas y una cabeza amarilla con la inscripción FTY 0,5 mg.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO