



## NINTEDANIB (VARGATEF®)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Nintedanib es un agente citostático indicado en el tratamiento de cáncer de pulmón.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

VARGATEF 100 MG CAP E/120

VARGATEF 150 MG CAP E/60

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 25°C). Proteger de la luz y de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Las cápsulas de nintedanib deben tomarse por vía oral, enteras (sin masticar), CON alimentos y con un vaso de agua. La dosis se administra dos veces al día, 1 cada 12 horas.

Evite el contacto con la piel y lávese las manos antes y después de cada toma.

No tome nintedanib los días que vaya a recibir quimioterapia intravenosa.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general la mayoría de los pacientes toleran bien nintedanib. Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer son: diarrea, mayor riesgo de infecciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal y alteraciones hepáticas (como un aumento de la bilirrubina en sangre).

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de nintedanib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, nintedanib también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo o la lactancia.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lecitina de soja

### Identificación

Vargatef 100 mg se presenta en forma de cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color melocotón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de la empresa Boehringer Ingelheim y "100".

Vargatef 150 mg se presenta en forma de cápsulas de gelatina blanda oblongas, opacas y de color marrón, grabadas en un lado en color negro con el logotipo de Boehringer Ingelheim y "150".



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**