



DOLUTEGRAVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Dolutegravir es un inhibidor de la integrasa indicado, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, en el tratamiento de la infección por VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TIVICAY 50MG COMP E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C). Proteger de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos de dolutegravir enteros, CON o SIN alimentos, con un poco de agua.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de dolutegravir, tómela tan pronto como sea posible, excepto si faltan menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima dosis.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a dolutegravir se encuentran: diarrea, náuseas, cefaleas y alteraciones del sueño como insomnio o pesadillas.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

Observaciones

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento. No deje de tomar la medicación sin avisar a su médico.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de dolutegravir, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico. Si toma antiácidos tipo Almax®, hierro, calcio o complejos vitamínicos con minerales debe tomarlos 2 horas antes o 6 horas después de dolutegravir

No tome zumo de POMELO o HIERBA de SAN JUAN durante el tratamiento.

Dolutegravir debe utilizarse durante el embarazo sólo si el beneficio esperado justifica el potencial riesgo para el feto. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Dolutegravir puede causar mareo, si se siente mareado evite conducir o manejar maquinaria pesada.

Excipientes de declaración obligatoria

Alcohol polivinílico

Identificación

TIVICAY® 50mg se presenta en forma de comprimidos de color amarillo con forma ovalada y la inscripción "SV572" en un lado y "50" en el otro.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**