



## IMATINIB

### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Imatinib es un agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

GLIVEC COMP 100mg E/60

GLIVEC COMP 400mg E/60

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Imatinib debe tomarse con alimentos para proteger el estómago.

NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento con imatinib.

Los comprimidos deben tomarse con un gran vaso de agua. Si no pudiera tragar los comprimidos, puede disolverlos en un vaso de agua o zumo de manzana.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, erupción, calambres musculares, dolor muscular y de huesos e inflamación (incluyendo ojos hinchados e inflamación del tobillo), cansancio, rápido aumento de peso (el tratamiento con imatinib puede provocar que su cuerpo retenga agua), riesgo aumentado de infección (que puede manifestarse como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras en la boca), sangrado o aparición de moratones de forma inesperada sin haber sufrido ningún golpe, fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar).

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de imatinib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, imatinib también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Imatinib aumenta la sensibilidad a la luz, por lo que deben evitarse exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Durante el tratamiento con imatinib puede padecer mareos o visión borrosa. Por lo tanto, se recomienda precaución cuando conduzca un coche o utilice maquinaria.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Imatinib no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con imatinib.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Glivec comprimidos 100 mg: recubiertos con película, redondos, de color amarillo muy oscuro a naranja-pardo, con la marca «NVR» en una cara y «SA» y ranura en la otra.

Glivec comprimidos 400 mg: recubiertos con película, ovalados, de color amarillo muy oscuro a naranja-pardo, con la marca «NVR» en una cara y «SL» en la otra.



### ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO