



PIRFENIDONA



¿Qué es y para qué se utiliza?

Pirfenidona es un medicamento indicado para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática (enfermedad que afecta a los pulmones)

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ESBRIET 267 MG 270 CAPSULAS

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (<30°C)

¿Cómo se administra?

Pirfenidona se administra habitualmente tres veces al día con las comidas. Las cápsulas deben tragarse enteras con agua, durante o después de una comida para reducir el riesgo de efectos secundarios como náuseas y mareo. NO beba zumo de pomelo mientras esté en tratamiento con este medicamento ya que podría hacer que no funcionara correctamente.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

No disminuya la dosis ni suspenda el tratamiento sin consultar con su médico. Su médico le dirá cuándo y cómo suspender el tratamiento.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Puede producir cansancio, debilidad, problemas de estómago (ardor, dispepsia, náuseas y diarrea), reacciones cutáneas de sensibilidad a la luz o cambios significativos de las concentraciones de las enzimas hepáticas.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de pirfenidona cuando se administra conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

Evite el sol (también las lámparas de rayos UVA) mientras esté tomando este medicamento y utilice diariamente una crema de protección solar. Cúbrase brazos, piernas y cabeza para reducir la exposición a la luz solar

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

ESBRIET® se presenta en cápsulas duras con cuerpo opaco de color azul y tapa de color dorado, con la impresión de <InterMune 267 mg> en tinta marrón. Las cápsulas están envasadas en blisters de aluminio.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**