



GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR (MAVIRET®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Maviret® es una combinación de dos antivirales: glecaprevir y pibrentasvir. Está indicado para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

MAVIRET 100/40 COMP E/84

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C).

¿Cómo se administra?

Deben tomarse 3 comprimidos por vía oral una vez al día, CON alimentos. Tome Maviret® aproximadamente a la misma hora todos los días.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Maviret® se administra cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis siga las siguientes instrucciones:

- Si se da cuenta en el plazo de 18 horas desde el momento en que toma Maviret® habitualmente, debe tomar los comprimidos lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si han pasado 18 horas o más desde el momento en que toma Maviret® habitualmente, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general, Maviret® es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento son: cefalea (dolor de cabeza) y fatiga.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Maviret® cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, Maviret® también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta 4 meses posteriores a su finalización. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si Maviret® puede excretarse por leche materna. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Los comprimidos de Maviret son comprimidos recubiertos con película de color rosa, oblongos, con forma curva en ambas caras (biconvexos), de 18,8 mm x 10,0 mm y marcados con "NXT" en una cara.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**