



ABACAVIR/LAMIVUDINA/DOLUTEGRAVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Combinación de tres fármacos antirretrovirales, un inhibidor de la integrasa (dolutegravir) y dos inhibidores de la transcriptasa inversa (abacavir y lamivudina), indicados en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TRIUMEQ 50MG/600MG/300MG COMP REC E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30 °C). Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. No tire el desecante.

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos de Triumeq® enteros, CON o SIN alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis de Triumeq®, tómela tan pronto como sea posible, excepto si faltan menos de 4 horas para la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima dosis.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal), dolor de cabeza, mareo, insomnio, fatiga y reacciones de hipersensibilidad (VER OBSERVACIONES).

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento. Tome este medicamento tal y como le ha indicado su médico. No deje de tomar la medicación sin avisar a su médico.

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD:

Este medicamento puede provocar una reacción de hipersensibilidad o reacción alérgica grave para su salud. Cuando aparece, suele ocurrir en las primeras seis semanas de tratamiento (aunque puede ocurrir en cualquier momento) y empeora al continuarlo. Si se reconoce a tiempo su aparición no hay por qué preocuparse. Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: fiebre, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, cansancio, malestar general, respiración entrecortada, dolor de garganta o tos.

Su médico valorará si estos síntomas son debidos a la reacción de hipersensibilidad o a otras causas y si debe o no interrumpir el tratamiento con este medicamento. Si su médico interrumpe el tratamiento con Triumeq(R), JAMÁS vuelva a tomarlo, ni ningún otro medicamento que contenga abacavir o dolutegravir.

Si por cualquier motivo ha dejado de tomar Triumeq®, es importante que se ponga en contacto con su médico antes de reiniciar tratamiento.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Triumeq®. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico. No tome zumo de POMELO o HIERBA de SAN JUAN durante el tratamiento.

El tratamiento antirretroviral no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus a otras personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Triumeq®.

Si se siente mareo evite conducir o manejar maquinaria pesada.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

TRIUMEQ® se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color morado, ovalados, biconvexos y con la inscripción "572 Tri" en un lado.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**