



SILDENAFILO



¿Qué es y para qué se utiliza?

Sildenafil es un medicamento que reduce la presión sanguínea pulmonar dilatando los vasos sanguíneos de los pulmones. Se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión en los vasos sanguíneos del pulmón).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

REVATIO 20MG COMP E/90

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura inferior a 30°C y en el envase original para protegerlo de la humedad.

¿Cómo se administra?

Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos.

No tome zumo de POMELO durante el tratamiento con sildenafil.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes asociados a sildenafil son: cefalea (dolor de cabeza), rubefacción (enrojecimiento de la piel), diarrea y dispepsia (sensación de malestar en la parte superior del abdomen).

Observaciones

Algunos medicamentos pueden interferir con el efecto de sildenafil cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, sildenafil también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si sildenafil puede excretarse por leche materna. Se recomienda interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

REVATIO® 20 MG: se presenta en forma de comprimidos redondos, blancos, recubiertos con película marcados "PFIZER" en una cara y "RVT 20" en la otra.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

																	
8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23		

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**