



RIOCIGUAT



¿Qué es y para qué se utiliza?

Riociguat (ADEMPAS®) es un medicamento que reduce la presión sanguínea pulmonar dilatando los vasos sanguíneos de los pulmones.

Se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión en los vasos sanguíneos del pulmón).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ADEMPAS 1 mg COMP E/42

ADEMPAS 1,5 mg COMP E/42

ADEMPAS 2 mg COMP E/42

ADEMPAS 2,5 mg COMP E/42

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 25°C).

¿Cómo se administra?

El medicamento se toma tres veces al día, por vía oral, su médico le habrá explicado la dosis y duración del tratamiento, siendo diferente para cada paciente.

Los comprimidos pueden tomarse generalmente CON o SIN alimentos pero debe tomarlo siempre de la misma manera. Tome Adempas® aproximadamente a la misma hora cada día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis, continúe con la dosis siguiente, según lo previsto. Nunca tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a ADEMPAS® destacan: dolor de cabeza, mareo, indigestión, hinchazón de las extremidades, diarrea, náuseas o vómitos

Puede suceder que tosa con sangre o sangre por la nariz. Si esto sucede, contacte con su médico inmediatamente.

Observaciones

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

- Comprimido de 0,5 mg: comprimidos redondos y biconvexos de color blanco, de 6 mm, marcados con la cruz de Bayer en un lado y 0,5 y una "R" en el otro.
- Comprimido de 1 mg: comprimidos redondos y biconvexos de color amarillo pálido, de 6 mm, marcados con la cruz de Bayer en un lado y 1 y una "R" en el otro.
- Comprimido de 1,5 mg: comprimidos redondos y biconvexos de color amarillo anaranjado, de 6 mm, marcados con la cruz de Bayer en un lado y 1,5 y una "R" en el otro.
- Comprimido de 2 mg: comprimidos redondos y biconvexos de color naranja pálido, de 6 mm, marcados con la cruz de Bayer en un lado y 2 y una "R" en el otro.
- Comprimido de 2,5 mg: comprimidos redondos y biconvexos de color rojo anaranjado, de 6 mm, marcados con la cruz de Bayer en un lado y 2,5 y una "R" en



el otro.

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20			22	23	
																		

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**