



## ELBASVIR/GRAZOPREVIR (ZEPATIER®)



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Zepatier® es una combinación de dos antivirales: elbasvir y grazoprevir. Está indicado para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ZEPATIER 50/100 MG COMP E/28

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C) y en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Zepatier® debe tomarse por vía oral, CON o SIN alimentos, un comprimido al día. Tome Zepatier® aproximadamente a la misma hora todos los días.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Zepatier® se administra cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis siga las siguientes instrucciones:

- Si se da cuenta dentro de las 16 horas desde que toma Zepatier® habitualmente, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si se da cuenta tras 16 horas o más desde el momento en que toma Zepatier® habitualmente, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general, Zepatier® es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento son: cefalea (dolor de cabeza) y astenia (cansancio y fatiga).

Efectos adversos menos frecuentes: insomnio, trastornos gastrointestinales (diarrea, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, boca seca)

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Zepatier® cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, Zepatier® también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa, sodio

### Identificación

Comprimido ovalado de color beige, de dimensiones 21 mm x 10 mm, grabado con la inscripción "770" en una cara y liso en la otra.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

																
8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**