



LAPATINIB

¿Qué es y para qué se utiliza?

Agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TYVERB COMP 250mg E/140

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Lapatinib debe tomarse en ayunas (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento con lapatinib.

Debe tomar los comprimidos que su médico le haya prescrito ENTEROS con agua, uno tras otro, a la misma hora cada día. Es importante que los tome todos los días a la misma hora en relación con las comidas. Por ejemplo, puede tomar siempre sus comprimidos una hora antes del desayuno.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes durante el tratamiento con lapatinib son diarrea, náuseas, síndrome mano-pie (palmas y plantas de los pies enrojecidos o doloridos), erupción, anemia (que puede manifestarse con cansancio), alteraciones hepáticas (que se pueden manifestar como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, picor, orina oscura) y alteraciones cardíacas (latidos irregulares o respiración entrecortada).

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de lapatinib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, lapatinib también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Lapatinib no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con lapatinib.

Excipientes de declaración obligatoria

Carboximetilamidón

Identificación

Tyverb comprimidos 250 mg: recubiertos con película con forma ovalada, biconvexos, amarillos, con "GS XJG" grabado en una cara.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO