



PEGINTERFERON ALFA 2-a



¿Qué es y para qué se utiliza?

Indicado en el tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con ribavirina. Los interferones modifican la respuesta del sistema inmune del organismo.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

PEGASYS jer 135 mcg E/4

PEGASYS jer 180 mcg E/4

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en NEVERA (entre 2-8°C). No congelar. Proteger de la luz.

¿Cómo se administra?

Es una jeringa precargada que se administra vía subcutánea (bajo la piel, en muslo o abdomen), normalmente una vez por semana. Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y aproximadamente a la misma hora. Se recomienda administrar por la NOCHE.

Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección con una gasa impregnada en alcohol y alterne el lugar en cada administración.

Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos. NO frote.

Se recomienda sacar de la nevera la jeringa que vaya a inyectarse al menos 15 minutos antes. Dicha jeringa NUNCA debe reutilizarse.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Peginterferon se administra normalmente una vez por semana. Si ha olvidado la dosis actúe de la siguiente manera:

- Si han pasado 1 o 2 días inyecte la dosis lo antes posible y continúe con la siguiente inyección siguiendo el calendario previsto.
- Si han pasado de 3 a 5 días inyecte la dosis lo antes posible y pase a inyectar las dosis siguientes en intervalos de 5 días hasta que recupere el ritmo semanal previsto.
- Si han pasado 6 días espere a inyectarse la dosis al día siguiente para mantener el ritmo habitual.

No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: síndrome pseudogripal el día de la inyección (fatiga, dolor muscular y/o articular, fiebre, escalofríos, cefalea), disminución de las defensas y/o de las plaquetas, náuseas, pérdida de apetito, sequedad de piel y boca, tos, caída de cabello, insomnio, irritabilidad, depresión, reacciones en el punto de inyección (enrojecimiento, dolor, picor). Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Cuando el peginterferon se utiliza sólo, es menos probable que se produzcan algunos de estos efectos que cuando se administra asociado a ribavirina. Tanto la aparición como la intensidad de los mismos dependen de cada persona, después del primer mes los efectos son menos numerosos y menos severos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de peginterferon. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Tras un adiestramiento adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo u otra persona (familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura.

No conduzca ni maneje máquinas si se encuentra somnoliento, cansado o confuso mientras esté en tratamiento con peginterferon.

Cuando peginterferon se utiliza en combinación con ribavirina, tanto los pacientes masculinos como los femeninos deben tener especial precaución en sus relaciones sexuales, si existe riesgo de embarazo, ya que la ribavirina puede ser muy dañina para el feto.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 7 meses después. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

PEGASYS®: Alcohol bencílico, sodio y sales.

Identificación

PEGASYS® 135 mcg: solución inyectable contenida en jeringas precargadas de 0,5 ml con émbolo amarillo. Envases de 4 jeringas.

PEGASYS® 180 mcg: solución inyectable contenida en jeringas precargadas de 0,5 ml con émbolo rojo. Envases de 4 jeringas.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**