



TIPRANAVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tipranavir es un inhibidor de la proteasa que, en combinación con otros fármacos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

APTIVUS CAPS 250MG E/120

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento debe conservarse en nevera.

Una vez abierto caduca a los 60 días (temperatura no superior a 25°C), es aconsejable que después de abrir el frasco por primera vez escriba la fecha de apertura en la etiqueta y/o el envase.

¿Cómo se administra?

Las cápsulas de tipranavir deben tragarse enteras (no romper, abrir o masticar) y CON alimentos.

Tipranavir se toma habitualmente con ritonavir, en ese caso, ambos fármacos deben administrarse juntos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a tipranavir se encuentran: cefalea, trastornos gastrointestinales (diarrea), vértigo, cambios de humor, dificultad de concentración, fatiga, aumento del colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre, posible aumento de sangrado.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparece alguno de estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de tipranavir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se recomienda tomar tipranavir junto con antiácidos. Si fuera necesario, tome el tipranavir una hora antes o dos horas después de los antiácidos.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento (durante el tratamiento con tipranavir no puede tomar anticonceptivos orales). Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Evite la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Aceite de Ricino
Etanol
Propilenglicol
Sorbitol
Glicerina

Identificación

APTIVUS® CAPSULAS: se presenta en forma de cápsulas blandas color rosa que llevan impreso el código "TPV 250".



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conservar sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO