



## VEMURAFENIB



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Vemurafenib es un agente antineoplásico indicado en melanoma.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ZELBORAF 240 MG COMP E/56

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C) en el embalaje original para protegerlo de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Los comprimidos de Vemurafenib deben tomarse ENTEROS con un vaso de agua después de una COMIDA. Vemurafenib se administra generalmente cada 12 horas.

NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento con Vemurafenid.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis, puede tomarla hasta 4 horas antes de la siguiente dosis para mantener el régimen posológico de dos dosis diarias. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son alteraciones de la piel (erupciones, sequedad, picor, fotosensibilidad...), alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento...), tos, cefaleas, dolores musculares o reacciones de hipersensibilidad (VER OBSERVACIONES).

### Observaciones

#### REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A VEMURAFENIB:

Este medicamento puede provocar una reacción de hipersensibilidad o reacción alérgica grave para su salud. Si se reconoce a tiempo su aparición no hay por qué preocuparse. Consulte a su médico INMEDIATAMENTE si nota cualquiera de los siguientes síntomas: hinchamiento de la cara, los labios o la lengua, erupción cutánea, enrojecimiento y/o picores, cansancio, malestar general o respiración entrecortada.

Su médico valorará si estos síntomas son debidos a la reacción de hipersensibilidad o a otras causas y si debe o no interrumpir el tratamiento con este medicamento. Si su médico interrumpe el tratamiento JAMÁS vuelva a tomarlo.

Se han registrado reacciones de fotosensibilización, por lo que deben evitarse exposiciones prolongadas a la luz solar o ultravioleta. Es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar. Es conveniente no conducir de noche debido al aumento de sensibilidad frente a las luces y a la visión borrosa. En caso de aparición de cualquier efecto a nivel visual, no conduzca ni maneje ningún tipo de maquinaria pesada.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante un período de al menos 6 meses después del mismo.

La lactancia materna debe evitarse durante el tratamiento con vemurafenib.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de vemurafenib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, puede alterar la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Zelboraf® se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color blanco rosado y grabado en una cara el logotipo VEM.

### ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	
 																	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

#### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**