



## DIMETILFUMARATO



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Dimetilfumarato está indicado en el tratamiento de la esclerosis múltiple remitente recurrente.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TECFIDERA 120MG CAPS E/14

TECFIDERA 240MG CAPS E/56

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C). Proteger de la luz y la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Dimetilfumarato debe tomarse por vía oral, CON alimentos, generalmente dos veces al día. La cápsula debe tragarse entera con un poco de agua.

La dosis de inicio consiste en 120mg dos veces al día. Después de 7 días, se incrementa la dosis a 240mg dos veces al día.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si han transcurrido más de 4 horas de la dosis olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son enrojecimiento de la cara o cuello (rubefacción), sensación de calor, picor o ardor, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto del dimetilfumarato cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, dimetilfumarato también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Antes de comenzar el tratamiento informe a su médico sobre cualquier trastorno de hígado, de riñón o gastrointestinal, o si padece alguna infección grave.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si dimetilfumarato puede excretarse por leche materna. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Tecfidera® 120 mg se presenta en forma de cápsulas duras gastrorresistentes verdes y blancas con la impresión "BG-12 120 mg". Cada envase contiene 14 cápsulas en blister.

Tecfidera® 240 mg se presenta en forma de cápsulas duras gastrorresistentes verdes con la impresión "BG-12 240 mg". Cada envase contiene 56 cápsulas en blister.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

																
8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**