



SIROLIMUS



¿Qué es y para qué se utiliza?

Medicamento inmunosupresor indicado para prevenir el rechazo de un órgano trasplantado.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

RAPAMUNE COMP 0,5MG E/100

RAPAMUNE COMP 1MG E/100

RAPAMUNE COMP 2MG E/100

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C).

¿Cómo se administra?

Sirolimus se puede tomar con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo (con el mismo tipo de comida) y a la misma hora del día. NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento con sirolimus.

Debe ingerir los comprimidos ENTEROS (NO mastique, machaque o rompa los comprimidos).

Si está en tratamiento con ciclosporina al mismo tiempo que con sirolimus, debe tomar sirolimus 4 horas después de la dosis de ciclosporina.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Sirolimus se administra normalmente cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son anemia, fiebre, hipertensión, hipocalcemia e hipofosfatemia (descenso de potasio y fósforo en sangre respectivamente), riesgo aumentado de infecciones (especialmente del tracto urinario), hiperglucemia (elevación de azúcar en sangre), aumento de triglicéridos (un tipo de grasa) y colesterol en sangre, dolor (abdominal, muscular, articular), edema periférico, taquicardia (latidos muy rápidos), acné, diarrea, estreñimiento, náuseas, cefalea, cicatrización de heridas anormal, alteración de las pruebas hepáticas y renales.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de sirolimus cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, sirolimus también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

La interrupción del tratamiento puede aumentar las posibilidades de rechazo del órgano trasplantado. Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.

Debe evitar exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Las vacunas pueden ser menos efectivas durante el tratamiento con sirolimus, estando algunas contraindicadas. Consulte con su médico antes de vacunarse.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos en las 12 semanas siguientes a su finalización. Sirolimus no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho

durante el tratamiento con sirolimus.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa, sacarosa

Identificación

Comprimido recubierto triangular de color blanco que lleva grabado en una cara "RAPAMUNE 1 mg".

Comprimido recubierto triangular de color marrón que lleva grabado en una cara "RAPAMUNE 2 mg".

Comprimido recubierto triangular de color gris que lleva grabado en una cara "RAPAMUNE 0,5 mg".



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO