



## VORICONAZOL ORAL



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Antifúngico triazólico de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

VFEND 200MG COMP E/14

VFEND 50MG COMP E/28

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a Tª ambiente (25 °C).

### ¿Cómo se administra?

Voriconazol debe tomarse en ayunas (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Voriconazol se administra cada 12 h. En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes de voriconazol son fiebre, cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, edema periférico (hinchazón de los pies), alteraciones de la visión (visión borrosa, percepción alterada de la luz, molestias con luz intensa...), reacciones cutáneas, alteraciones hepáticas (que se pueden manifestar como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, orina oscura) y fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar). Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas.

### Observaciones

El tratamiento debe iniciarse con una dosis de carga durante las primeras 24 horas que es el doble de la dosis de mantenimiento prescrita por su médico. Esta dosis de carga NO debe tomarse durante más de 24 horas.

Voriconazol presenta un elevado número de interacciones potenciales que pueden dar lugar tanto a falta de efectividad como a efectos tóxicos. Asimismo, voriconazol también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros productos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Se han registrado reacciones de fotosensibilidad, especialmente durante tratamientos prolongados, por lo que deben evitarse exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Es conveniente no conducir de noche debido al aumento de la sensibilidad frente a las luces y a la visión borrosa. En caso de aparición de cualquier efecto adverso a nivel visual, no conduzca ni maneje ningún tipo de maquinaria peligrosa.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

### Identificación

Comprimidos 50mg: color blanco, redondos, con la palabra "Pfizer" grabada en una cara y "VOR50" en la otra.

Comprimidos de 200mg: color blanco, con forma capsular, con la palabra "Pfizer" grabada en una cara y "VOR200" en la otra.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO