



BEXAROTENO

¿Qué es y para qué se utiliza?

Bexaroteno es un agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TARGRETIN Cáps 75 mg E/100

¿Cómo se debe conservar?

No conservar a temperatura (no superior a 30°C). Mantener el frasco perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?

Las cápsulas se deben tomar con comida en una dosis única diaria.

NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento.

Se recomienda limitar el consumo de alimentos o complejos vitamínicos que contengan vitamina A por aumento de toxicidad.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones gastrointestinales (vómitos, diarrea, náuseas, estreñimiento, flatulencia...), aumento de lípidos en sangre (colesterol, triglicéridos), sequedad de boca, dolor de cabeza, fatiga, caída del cabello, ojos y piel seca, dermatitis o erupción en la piel, hipotiroidismo, alteraciones hematológicas (disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos).

Avisar a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de lenalidomida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Se recomiendan medidas anticonceptivas eficaces tanto en los pacientes varones como en las mujeres durante el tratamiento y por lo menos un mes después de su finalización. Es preferible utilizar métodos barrera (preservativo), puesto que bexaroteno puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Bexaroteno aumenta la sensibilidad a la luz, por lo que deben evitarse exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Es conveniente no conducir de noche debido al aumento de la sensibilidad frente a las luces y a la visión borrosa. En caso de aparición de cualquier efecto adverso a nivel visual, no conduzca ni maneje ningún tipo de maquinaria peligrosa.

Excipientes de declaración obligatoria

Sorbitol
Glicerina
Propilenglicol
Manitol

Identificación

Cápsula blanda blanquecina, rellena con una suspensión líquida e impresa con la palabra "Targretin".



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**