



BOSUTINIB



¿Qué es y para qué se utiliza?

Bosutinib es un agente citostático indicado en el tratamiento de la leucemia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

BOSULIF 100 MG COMP E/120

BOSULIF 500 MG COMP E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30°C).

¿Cómo se administra?

Bosutinib debe tomarse CON alimentos, generalmente una vez al día.

No tome zumo de POMELO durante el tratamiento con Bosutinib

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de bosutinib, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a bosutinib destacan: astenia/fatiga, disminución del apetito, diarrea, náuseas, vómitos, aumento del riesgo de infecciones (sobre todo respiratorias), cefalea, tos, erupciones cutáneas y elevación de transaminasas (enzimas hepáticas).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de bosutinib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, bosutinib puede alterar la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 30 días después de finalizarlo. Bosutinib no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada informe inmediatamente a su médico.

Debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

BOSULIF® se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color amarillo y con forma ovalada biconvexa, marcado con "Pfizer" en una cara y con "100" en la otra.

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

																	
8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23		

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**