



## TRAMETINIB



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Trametinib es un medicamento cistostático que está indicado para el tratamiento de distintos melanomas.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

MEKINIST COMP 0,5 MG E/30

MEKINIST COMP 2 MG E/30

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Una vez abierto el frasco, se puede conservar durante 30 días a una temperatura por debajo de 30°C.

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Tome la dosis prescrita una vez al día sin comida.

Tomar por lo menos una hora antes o dos horas después de las comidas.

Cuando se toma trametinib en combinación con dabrafenib (Tafinlar®), la dosis diaria de trametinib debe tomarse a la vez que Tafinlar®, en la dosis de la mañana o en la de la noche.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una dosis de trametinib, tome la dosis olvidada solo en caso de que falten más de 12 horas hasta la siguiente dosis.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: mayor propensión infecciones, disminución del apetito, dolor de cabeza, hipertensión, aumento de sangrado, tos, trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal), alteración de datos analíticos, trastornos de la piel (prurito, sequedad), dolor en articulaciones y cansancio.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de trametinib cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Se recomienda precaución cuando se administre trametinib con otros medicamentos (p.ej. verapamilo, ciclosporina, ritonavir, quinidina, itraconazol).

### Excipientes de declaración obligatoria

Polietilenglicol, manitol

### Identificación

Mekinist® 2 mg contiene un frasco con comprimidos de color rosa, redondos, biconvexos, recubiertos con película, de 7,5 mm aproximadamente, marcados con 'GS' en una cara y 'HMJ' en la cara opuesta.

Mekinist® 0,5 mg contiene un frasco con comprimidos de color amarillo, ovalados, biconvexos, recubiertos con película, de 4,8 x 8,9 mm aproximadamente, marcados con 'GS' en una cara y 'TFC' en la cara opuesta.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	
																

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**