



PALBOCICLIB



¿Qué es y para qué se utiliza?

Palbociclib está indicado para el tratamiento del cáncer de mama avanzado. Se debe administrar en combinación con letrozol o fulvestrant.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

PALBOCICLIB 125 MG CAPS E/23

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25 °C).

¿Cómo se administra?

Se debe tomar 1 cápsula al día, aproximadamente a la misma hora, y CON ALIMENTOS durante 21 días seguidos, después descansar 7 días sin medicamento. Las cápsulas se deben tragar enteras (sin masticar, ni abrir ni triturar).

Siga la pauta de letrozol o fulvestrant que le haya indicado su médico.

Si vomita después de tomar la cápsula, no tome otra dosis, y espere a la siguiente a su hora habitual.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar el medicamento, la siguiente dosis tómela a su hora habitual. Nunca duplique una dosis para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: mayor riesgo de padecer infecciones, fatiga, náuseas, vómitos, disminución del apetito, anemia, alopecia, diarrea. Otras reacciones adversas posibles son: visión borrosa, sequedad ocular, alteración del sabor, sangrado nasal.

Si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, consulte inmediatamente con su médico.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de palbociclib. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico. No tomar con zumo de pomelo, ni Hierba de San Juan (Hypericum). Se debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con palbociclib y durante al menos tres semanas después de la última dosis.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

IBRANCE® 125 mg se presenta en forma de cápsulas duras, opacas, con cuerpo de color caramelo (con "PBC 125" impreso en blanco) y tapa de color caramelo (con "Pfizer" impreso en blanco).



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**