



POSACONAZOL



¿Qué es y para qué se utiliza?

Antifúngico triazólico de amplio espectro indicado en el tratamiento de las infecciones fúngicas. Posaconazol también está indicado en la prevención de infecciones fúngicas en pacientes cuyo sistema inmune se encuentre debilitado.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

NOXAFIL SUSP 40MG/ML 105ML E/1

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a Tª ambiente (25 °C). No congelar.
Una vez abierto el envase, desechar pasadas cuatro semanas.

¿Cómo se administra?

Posaconazol debe tomarse con alimentos o con un suplemento alimenticio si no tolera los alimentos.
Agitar bien antes de usar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvidar una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Si toma usted el medicamento cada 12 horas, la recomendación es:
- Si no han pasado 6 horas desde el olvido: tome la dosis olvidada y continúe con el tratamiento sin modificar el horario.
- Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son dolor de cabeza, mareo, somnolencia, náuseas, falta de apetito, dolor de estómago, diarrea, vómitos, sequedad de boca, alteraciones hepáticas (que se pueden manifestar como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, orina oscura), erupción cutánea, cansancio, riesgo aumentado de infecciones, fiebre, alteración del ritmo cardiaco (latidos muy rápidos) y resultados anormales en las pruebas de corazón (electrocardiograma).

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Posaconazol presenta un elevado número de interacciones potenciales que pueden dar lugar tanto a falta de efectividad como a efectos tóxicos. Asimismo, posaconazol también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros productos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil tienen que utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. Posaconazol no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con posaconazol.

Excipientes de declaración obligatoria

Glucosa (1,75mg por cada 5ml)

Identificación

Noxafil suspensión oral blanca, con sabor a cereza, acondicionada en frascos de vidrio ámbar. Se proporciona con cada frasco una cucharilla para medir dosis de 2,5 y 5 ml de suspensión.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**