



TOLVAPTAN



¿Qué es y para qué se utiliza?

Tolvaptan se utiliza para el tratamiento de la hiponatremia secundaria al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH).

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

SAMSCA 15 MG COMP E/10

¿Cómo se debe conservar?

Los comprimidos se deben conservar a temperatura ambiente (25°C) y en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe administrarse preferiblemente por las mañanas, con independencia de que se tome con o sin alimentos. Los comprimidos deben ingerirse sin masticar con un vaso de agua. NO debe tomar con zumo de POMELO durante el tratamiento con tolvaptan.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela en cuanto se acuerde ese mismo día.

No tome dos dosis el mismo día para compensar una dosis omitida el día anterior.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Este fármaco produce pérdida de agua por aumento de la producción de orina por lo que puede producir sensación de sed, sequedad de boca. Es importante mantener una adecuada ingesta de líquidos especialmente durante las primeras 24 horas.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de tolvaptan cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, tolvaptan también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

SAMSCA® se presenta con comprimidos de color azul, triangular, ligeramente convexo, marcado en relieve con "OTSUKA" y "15" por un lado.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**