



PITOLISANT



¿Qué es y para qué se utiliza?

Es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de pacientes adultos con narcolepsia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

WAKIX COMP 20 MG REC E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.
Mantener el frasco perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad.

¿Cómo se administra?

Se debe tomar una vez al día por vía oral, por la mañana durante el desayuno. No se debe tomar la dosis de Pitolisant por la tarde o la noche, ya que podría tener dificultades para dormir.
Su médico le habrá indicado que comience con una dosis baja y que vaya aumentándola durante las primeras semanas de tratamiento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar el medicamento, tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: dificultad para dormir, sensación de ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de pitolisant. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

Comprimido recubierto con película de color blanco, redondo, biconvexo, marcado con un 20 en la cara.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**