



PERAMPANEL



¿Qué es y para qué se utiliza?

Peranpanel es un medicamento indicado para el tratamiento de crisis parciales de epilepsia (ataques epilépticos)

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

FYCOMPA 12 MG 28 COMPRIMIDOS

FYCOMPA 8 MG 28 COMPRIMIDOS

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (15-25°C)

¿Cómo se administra?

Peranpanel debe administrarse por vía oral, una vez al día, antes de acostarse. Los comprimidos deben ingerirse enteros. No se deben partir, masticar ni triturar.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvidó tomar un comprimido, espere hasta que le toque tomar la siguiente dosis y, después, continúe de la forma habitual.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si se ha saltado menos de 7 días de tratamiento con peranpanel, continúe tomando el comprimido diario según las indicaciones originales de su médico. Si se ha saltado más de 7 días de tratamiento con peranpanel, consulte a su médico inmediatamente.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son mareos y somnolencia. Además, otros efectos adversos frecuentes con este medicamento son aumento o disminución del apetito, aumento de peso, sensación de agresividad, enfado, irritabilidad, ansiedad o confusión, dificultad para andar u otros problemas del equilibrio, habla lenta, visión borrosa o visión doble, vértigos o náuseas, sensación de mucho cansancio (fatiga).

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de peranpanel cuando se administra conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

No se recomienda utilizar peranpanel durante el embarazo. Si está embarazada o en periodo de lactancia o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

FYCOMPA® se presenta como un comprimido de color naranja, redondo, biconvexo, con la inscripción E275 en una cara



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**