



## TADALAFILO



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Tadalafilo es un medicamento que reduce la tensión sanguínea pulmonar dilatando los vasos sanguíneos de los pulmones.

Se utiliza para tratar la hipertensión arterial pulmonar (elevada tensión en los vasos sanguíneos del pulmón).

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ADCIRCA 20MG 56 COMPRIMIDOS

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (<30°C), protegido de la humedad.

Matener fuera del alcance de los niños.

### ¿Cómo se administra?

Tadalafilo se puede administrar con o sin alimentos. Los comprimidos se deben tomar enteros con un vaso de agua

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

No disminuya la dosis ni suspenda el tratamiento sin consultar con su médico. Su médico le dirá cuándo y cómo suspender el tratamiento.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con tadalafilo puede aparecer dolor de cabeza, enrojecimiento, congestión nasal (nariz taponada), erección, indigestión (incluyendo dolor y malestar abdominal), dolores musculares, dolor de espalda y dolores en las extremidades.

En el caso de aparición de éstos o cualquier otro síntoma, consulte a su médico o farmacéutico.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de tadalafilo cuando se administra conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.

No se recomienda utilizar tadalafilo durante el embarazo. Si está embarazada o en periodo de lactancia o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

### Identificación

ADCIRCA® se presenta en forma de comprimidos recubiertos de color naranja incluidos en blisters.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**