



## CICLOSPORINA CAPSULAS



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Medicamento inmunosupresor indicado para prevenir el rechazo de un órgano sólido o médula ósea trasplantada. También se utiliza en el tratamiento de algunas enfermedades de origen autoinmune como: uveítis, psoriasis, síndrome nefrótico, artritis reumatoide y dermatitis atópica.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

SANDIMMUN NEORAL 100 MG E/30

SANDIMMUN NEORAL 25 MG E/30

SANDIMMUN NEORAL 50 MG E/30

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25°C) en su blister original.  
Al abrir el envase se percibe un olor característico que es normal.

### ¿Cómo se administra?

Las cápsulas de ciclosporina pueden tomarse con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo (con el mismo tipo de comida) y a la misma hora del día.  
Debe ingerir las cápsulas ENTERAS (no mastique ni abra las cápsulas).  
NO tome zumo de POMELO y evite alimentos ricos en potasio (por ejemplo: plátanos, nueces, acelgas...) durante el tratamiento con ciclosporina.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Ciclosporina se administra normalmente cada 12 h. En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.  
Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.  
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: incremento del vello en el cuerpo o en la cara (hirsutismo), temblor, hipertensión, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarreas, hinchazón en las encías (hiperplasia gingival), sensación de quemazón en manos y pies, riesgo aumentado de infecciones, elevación de potasio y lípidos (grasas) en sangre. Alteración en el funcionamiento del riñón y del hígado.  
Con menor frecuencia puede aparecer dolor de cabeza, erupciones de la piel, anemia moderada, aumento de niveles de azúcar en sangre, aumento de peso, hinchazón, calambres musculares y debilidad muscular.  
Avisé a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de ciclosporina cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectiva. Asimismo, ciclosporina también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.  
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

La interrupción del tratamiento puede aumentar las posibilidades de rechazo del órgano trasplantado. Nunca deje de tomarlo a no ser que se lo indique su médico.

Debe evitar exposiciones prolongadas a la luz del sol o a luz ultravioleta. También es recomendable el uso de protectores solares y cubrir el cuerpo frente a la luz solar.

Las vacunas pueden ser menos efectivas durante el tratamiento con ciclosporina, estando algunas contraindicadas. Consulte con su médico antes de vacunarse.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz (preferiblemente no hormonal) durante el

tratamiento. Ciclosporina no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con ciclosporina.

### Excipientes de declaración obligatoria

Etanol 11,8%, propilenglicol, glicerol, aceite de ricino.

### Identificación

SANDIMMUN NEORAL® 25 mg: cápsulas de gelatina blanda, ovaladas, color gris-azulado.  
SANDIMMUN NEORAL® 50mg:cápsulas de gelatina blanda, oblongas, color blanco-amarillento.  
SANDIMMUN NEORAL® 100mg: cápsulas de gelatina blanda, oblongas, color gris-azulado.



### ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**