



BOCEPREVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Boceprevir está indicado en el tratamiento de la infección crónica por virus de la hepatitis C en combinación con peginterferón y ribavirina.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

VICTRELIS 200 MG CAPSULAS DURAS E/336

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2 y 8 °C).
Si se conserva a temperatura ambiente, no deben superarse los 30°C y debe desecharse el medicamento transcurridos 3 meses.

¿Cómo se administra?

Boceprevir debe tomarse CON alimentos tres veces al día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de olvido:
- Si faltan menos de dos horas para la siguiente toma, saltar la toma olvidada y retomar la pauta habitual.
- Si faltan más de dos horas para la siguiente toma, tomar la dosis olvidada acompañada de alimentos y seguir la pauta habitual.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a boceprevir se encuentran: cansancio y debilidad, mareos, anemia, náuseas, diarrea, pérdida de apetito, dolor de cabeza, escalofríos, caída o debilidad del pelo y tos.

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos.

Observaciones

Boceprevir se debe usar siempre en combinación con pegintrón y ribavirina.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de boceprevir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si una paciente quedara embarazada durante el mismo, debe informar inmediatamente a su médico. Se desconoce si boceprevir puede excretarse por leche materna. Antes de iniciar la lactancia materna, consulte con su médico.

El tratamiento combinado de boceprevir, peginterferón y rivabirina puede influir en la capacidad de conducir ya que se ha asociado con la aparición de fatiga, mareos y visión borrosa.

La aparición de anemia durante el tratamiento con boceprevir es frecuente, por lo que se le realizarán análisis de sangre de manera frecuente.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa
Almidón pregelatinizado

Identificación

Boceprevir se presenta en una caja conteniendo 336 cápsulas repartidas en blísters de aluminio.
Cada cápsula tiene una cubierta opaca de color amarillo parduzco, con un logotipo de "MSD" impreso en tinta roja, y un cuerpo opaco de color crema con el código "314" impreso en tinta roja.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**