



4-AMINOPIRIDINA

¿Qué es y para qué se utiliza?

4-Aminopiridina (4-AP, Fampridina, Dalfampridina) está indicada como tratamiento para mejorar la marcha en pacientes con esclerosis múltiple.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

AMPYRA COMP 10MG E/60

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C)

¿Cómo se administra?

4-AP se toma por vía oral. La dosis habitual es de 10mg (un comprimido) dos veces al día. Los comprimidos han de tragarse enteros, sin masticar ni disolver. Deje transcurrir un intervalo aproximado de 12h entre cada toma.

Tome la dosis exacta que le ha pautado su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis no intente compensarla. Tome la siguiente dosis a la hora que tenga establecida. NUNCA tome más de dos comprimidos en un periodo de 24h.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Durante el tratamiento con 4-AP pueden aparecer efectos adversos que incluyen:

- Infección de vías urinarias.
- Insomnio, mareos, debilidad, problemas de equilibrio.
- Trastornos gastrointestinales (nauseas, estreñimiento, indigestión)
- Dolor de garganta, irritación de vías aéreas, dolor de cabeza y de espalda.

En el caso de aparición de éstos o cualquier otro tipo de efectos consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de 4-AP. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el mismo informe inmediatamente a su médico. Se desconoce si 4-AP puede excretarse por leche materna. Antes de iniciar la lactancia materna, consulte con su médico.

4-AP está contrindicado en pacientes con historial de convulsiones o con alteraciones renales. Si ha sufrido alguna de éstos problemas, consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

AMPYRA® se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color blanco, biconvexos, sin ranura y con la inscripción "A10" en una de las caras.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**