



UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76

Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es

http://ufpelafe.wix.com/ufpelafe

SOFOSBUVIR/LEDIPASVIR (HARVONI®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Harvoni® es una combinación de dos antivirales: sofosbuvir y ledipasvir. Está indicado para el tratamiento de la hepatitis C crónica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

HARVONI 90 MG / 400 MG COMP E/28

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C) y en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Harvoni® debe tomarse por vía oral, CON O SIN alimentos, un comprimido al día. Tome Harvoni® aproximadamente a la misma hora todos los días.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Harvoni se administra cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis siga las siguientes instrucciones:

- Si se da cuenta en el plazo de 18 horas desde el momento en que toma Harvoni® habitualmente, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si se da cuenta tras 18 horas o más desde el momento en que toma Harvoni® habitualmente, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

En general, Harvoni® es bien tolerado. Los efectos adversos más frecuentes del tratamiento son: cefalea (dolor de cabeza) y astenia (cansancio y fatiga).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Harvoni® cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, Harvoni® también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y hasta 4 meses posteriores a su finalización. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se desconoce si Harvoni® puede excretarse por leche materna. No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa monohidrato

Identificación

Harvoni® 90/400 mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película de color anaranjado y con forma de rombo, con "GSI" grabado por un lado y "7985" por el otro.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**