



AFATINIB (GIOTRIF®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Afatinib es un agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

GIOTRIF 20 MG COM

GIOTRIF 30 MG COM

GIOTRIF 40 MG COM

GIOTRIF 50 MG COM

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C en el embalaje original para protegerlo de la humedad y la luz.

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos de Afatinib ENTEROS y SIN alimentos, al menos 1 hora antes de la comida o 3 horas después.

Si los comprimidos no se pueden tragar enteros, se pueden dispersar en aproximadamente 100 ml de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se debe echar el comprimido en el agua sin tritararlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 100 ml de agua que deben beberse también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis, tómela lo antes posible, excepto si faltan menos de 8 horas para la próxima dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Afatinib destacan: aumento del riesgo de infecciones, disminución del apetito, síndrome mano-pie (palmas y plantas de los pies enrojecidos o doloridos), conjuntivitis o sequedad ocular.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir en la absorción de Afatinib, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

No tome ningún otro medicamento sin consultar antes a su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben de utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con afatinib y al menos un mes después de finalizarlo.

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

		8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20			22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**